

Probabilidade

Parte 6

Prof.: Eduardo Vargas Ferreira




Regra de Bayes



Thomas Bayes
1702 - 1761

Calculating a particular conditional probability that can't be directly viewed and is estimated from probabilities that can be viewed.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) \cdot \frac{P(B|A)}{P(B)}$$



Exemplo: filtro de Spam

$$P(\text{Spam} \mid \text{Palavras}) = P(\text{Spam}) \cdot \frac{P(\text{Palavras} \mid \text{Spam})}{P(\text{Palavras})}$$



Exemplo: detecção de fraude

$$P(\text{ Fraude } | \text{ Transações }) = P(\text{ Fraude}) \cdot \frac{P(\text{ Transações } | \text{ Fraude })}{P(\text{ Transações })}$$



Exemplo: probabilidade de compra

Desconto

$$X_1 = \begin{cases} 0, & \text{sem desconto} \\ 1, & \text{com desconto} \end{cases}$$

Frete grátis

$$X_2 = \begin{cases} 0, & \text{sem frete grátis} \\ 1, & \text{com frete grátis} \end{cases}$$

Sexo

$$X_3 = \begin{cases} 0, & \text{feminino} \\ 1, & \text{masculino} \end{cases}$$

$$P(\text{Buy} | X_1, X_2, X_3) \propto P(\text{Buy}) \cdot P(X_1 | \text{Buy}) \cdot P(X_2 | \text{Buy}) \cdot P(X_3 | \text{Buy})$$




Exemplo: produtos defeituosos

- ▶ Uma companhia possui três fábricas que produzem o mesmo produto.



- (i) **Fábrica I:** responsável por **30%** da produção e **1%** de itens defeituosos.
- (ii) **Fábrica II:** responsável por **45%** da produção e **2%** de itens defeituosos.
- (iii) **Fábrica III:** responsável por **25%** da produção com **1,5%** de defeituosos.


Exemplo: produtos defeituosos



1. Qual a probabilidade de encontrar um item defeituoso?

$$\begin{aligned}P(D) &= P(F_1) \cdot P(D|F_1) + P(F_2) \cdot P(D|F_2) + P(F_3) \cdot P(D|F_3) \\&= 0,3 \cdot 0,01 + 0,45 \cdot 0,02 + 0,25 \cdot 0,015 \\&= 0,01575.\end{aligned}$$

Exemplo: produtos defeituosos





2. Dado que encontramos um produto defeituoso, qual a probabilidade de que ele tenha sido produzido na Fábrica II?

$$P(F_2|D) = \frac{P(F_2) \cdot P(D|F_2)}{P(D)} = \frac{0,45 \cdot 0,02}{0,01575} = 0,5714.$$


Exemplo: teste de triagem

- Considere um teste de triagem de rotina para uma doença. Suponha que a frequência da doença na população (taxa básica) seja de 0,5%.



- $P(\text{Falso negativo}) = P(T - |D+) = 10\%$;
- $P(\text{Falso positivo}) = P(T + |D-) = 5\%$.

Exemplo: teste de triagem



- ▶ As probabilidades complementares das quantidades anteriores são:


$$P(T + |D+) = 1 - P(T - |D+) = 90\%;$$

$$P(T - |D-) = 1 - P(T + |D-) = 95\%;$$

Pergunta: Qual a probabilidade de se ter a doença, dado um teste positivo?

$$P(D + |T+) = \frac{P(D+) \cdot P(T + |D+)}{P(T+)}$$


Exemplo: teste de triagem



- Calculamos o denominador utilizando a lei da probabilidade total:

$$\begin{aligned}P(T+) &= P(T+ \cap D+) + P(T+ \cap D-) \\&= P(D+) \cdot P(T+ | D+) + P(D-) \cdot P(T+ | D-) \\&= 0,9 \times 0,005 + 0,05 \times 0,995 \\&= 0,05425.\end{aligned}$$

Exemplo: teste de triagem



- Assim, a probabilidade de se ter a doença, dado um teste positivo será:

$$\begin{aligned}P(D+ | T+) &= P(D+) \cdot \frac{P(T+ | D+)}{P(T+)} \\ &= 0,005 \cdot \frac{0,9}{0,05425} \\ &\approx 8,3\%.\end{aligned}$$

“Realizar um simples exame de urina pode levar a um falso positivo, o que poderia desencadear uma cascata de outros testes, apenas para descobrir ao final que não há nada de errado com você”, diz Mehrotra.

▶ [Link para o artigo](#)



Referências

- ▶ Bussab, WO; Morettin, PA. Estatística Básica. São Paulo: Editora Saraiva, 2006 (5ª Edição).
- ▶ Magalhães, MN; Lima, ACP. Noções de Probabilidade e Estatística. São Paulo: EDUSP, 2008.

