

Variáveis Aleatórias

Parte 5

Prof.: Eduardo Vargas Ferreira




Variáveis aleatórias contínuas

Definição: Uma função X , definida sobre o espaço amostral Ω e assumindo valores num intervalo de números reais, é dita uma variável aleatória contínua.




Variáveis aleatórias contínuas

Distribuição discreta



$$P(X = x)$$


Distribuição contínua



$$P(a \leq X \leq b)$$

Exemplo: relógio mecânico



- ▶ O ponteiro dos segundos de um relógio mecânico pode parar a qualquer instante, devido a algum defeito técnico ou término da bateria.



X = ângulo entre o XII e o ponteiro dos segundos.


Exemplo: relógio mecânico

x	0°	6°	12°	18°	...	348°	354°
$p(x)$	$1/60$	$1/60$	$1/60$	$1/60$...	$1/60$	$1/60$




Função densidade de probabilidade (f.d.p.)

- ▶ A função $f(x)$ é chamada função densidade de probabilidade (*f.d.p.*).



$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Propriedades da *f.d.p.*




$$\left. \begin{array}{l} \text{i) } 0 \leq f(x) \quad \forall x \\ \text{ii) } \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \end{array} \right\} 0 \leq \int_a^b f(x) dx \leq 1$$

Exemplo: demanda de água potável

- ▶ A demanda semanal de água potável de uma cadeia de lojas, em milhares de litros, é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{se } 0 < x < 1. \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$






i) $2x \geq 0, \forall x;$

ii) $\int_0^1 2x \, dx = 1.$

Característica de uma *f.d.p.*

- ▶ Qualquer função não negativa, cuja área total sob a curva seja igual à 1, pode caracterizar uma *f.d.p.*



Exemplo: conserto de um fusca

- ▶ O tempo necessário, em horas, para consertar um fusca em uma garagem é dado por



$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } 0 \leq x < 1. \\ 2 - x, & \text{se } 1 \leq x < 2. \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \underbrace{\int_0^1 x dx}_{\downarrow} + \underbrace{\int_1^2 2 - x dx}_{\downarrow} + \int_2^{\infty} 0 dx = 1$$
$$\frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \quad 2x - \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 = \frac{1}{2}$$

Exemplo: colher medidora

- Considere que a distribuição do erro de medição, em gramas, de uma colher medidora seja:




$$f(x) = \begin{cases} Cx^2, & \text{se } 0 \leq x < 1. \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \underbrace{\int_0^1 Cx^2 dx}_{\downarrow} + \int_1^{\infty} 0 dx = 1$$


$$\left. \frac{Cx^3}{3} \right|_0^1 = 1 \rightarrow C = 3$$

Probabilidade de um ponto



$$P(a \leq X \leq a) = \int_a^a f(x) dx = 0$$

Probabilidade de um ponto



$$P(a \leq X \leq b)$$

↙ ↘

$$P(a < X < b) \qquad P(a \leq X < b)$$

Exemplo: vida útil de eletrodomésticos

- A vida útil, em anos, de um eletrodoméstico é uma variável aleatória com densidade dada por:



$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \cdot e^{-x/2}}{4}, & \text{se } x \geq 0. \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

1. Se o tempo de garantia do fabricante é de seis meses, qual a proporção de aparelhos que devem usar essa garantia?

$$\begin{aligned} P\left(X < \frac{1}{2}\right) &= \int_0^{1/2} \frac{x \cdot e^{-x/2}}{4} dx \\ &= \frac{-2e^{-x/2}(x+2)}{4} \Big|_0^{1/2} \\ &= 0.0265. \end{aligned}$$

Referências

- ▶ Bussab, WO; Morettin, PA. Estatística Básica. São Paulo: Editora Saraiva, 2006 (5ª Edição).
- ▶ Magalhães, MN; Lima, ACP. Noções de Probabilidade e Estatística. São Paulo: EDUSP, 2008.

