

Testes de hipótese

Parte 5

Prof.: Eduardo Vargas Ferreira




Procedimentos gerais para um teste de hipótese

1. Definir a hipótese nula (H_0) e a alternativa (H_1).

$$H_0 : p = 0.5 \quad vs \quad H_1 : p \neq 0.5$$

2. Com base em H_1 , definir o tipo de teste.
3. Definir um nível de significância α , análogo o nível de confiança $100(1 - \alpha)\%$ do IC.
4. Determinar a região crítica (região de rejeição) baseado na distribuição amostral, sob H_0 .
5. Calcular a **estatística de teste**, com base na sua distribuição amostral sob a hipótese nula.
6. Conclusão.




Se $\hat{p} = 0.65$, existe evidência para rejeitar H_0 ao nível de significância de 5%?

Procedimentos gerais para um teste de hipótese

1. Definir a hipótese nula (H_0) e a alternativa (H_1).

$$H_0 : p = 0.5 \quad vs \quad H_1 : p \neq 0.5$$

2. Com base em H_1 , definir o tipo de teste.
3. Definir um nível de significância α , análogo o nível de confiança $100(1 - \alpha)\%$ do IC.
4. Determinar a região crítica (região de rejeição) baseado na distribuição amostral, sob H_0 .
5. **Calcular a estatística de teste, com base na sua distribuição amostral sob a hipótese nula.**
6. Conclusão.



Se $\hat{p} = 0.65$, existe evidência para rejeitar H_0 ao nível de significância de 5%?


Estatística de teste

- A estatística de teste é um valor usado para tomar a decisão sobre H_0 , **supondo ela verdadeira**.

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad vs \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

Estatística de teste para a média μ

- $z_{obs.} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$
- $t_{obs.} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$
- $z_{obs.} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}}$




Procedimentos gerais para um teste de hipótese

1. Definir a hipótese nula (H_0) e a alternativa (H_1).

$$H_0 : p = 0.5 \quad vs \quad H_1 : p \neq 0.5$$


2. Com base em H_1 , definir o tipo de teste.
3. Definir um nível de significância α , análogo o nível de confiança $100(1 - \alpha)\%$ do IC.
4. Determinar a região crítica (região de rejeição) baseado na distribuição amostral, sob H_0 .
5. Calcular a estatística de teste, com base na sua distribuição amostral sob a hipótese nula.
6. **Conclusão.**



Se $\hat{p} = 0.65$, existe evidência para rejeitar H_0 ao nível de significância de 5%?


Conclusão do teste: valor da estatística

- Se a estatística de teste **pertencer à região crítica**, rejeita-se H_0 , em favor de H_1 , ao nível significância α . Caso contrário, não rejeita-se H_0 .




Conclusão do teste: valor da estatística

- Se a estatística de teste **pertencer à região crítica**, rejeita-se H_0 , em favor de H_1 , ao nível significância α . Caso contrário, não rejeita-se H_0 .




Conclusão do teste: valor da estatística

- Se a estatística de teste **pertencer à região crítica**, rejeita-se H_0 , em favor de H_1 , ao nível significância α . Caso contrário, não rejeita-se H_0 .



Conclusão do teste: valor da estatística

- Se a estatística de teste **pertencer à região crítica**, rejeita-se H_0 , em favor de H_1 , ao nível significância α . Caso contrário, não rejeita-se H_0 .



Exemplo: máquina de empacotar

- ▶ Uma empacotadora de café está calibrada se houver 700 g em cada embalagem. A fim de verificar o funcionamento da máquina, foi coletado uma amostra de 40 pacotes, resultando em $\bar{x} = 698$.



- ▶ Considerando $\sigma = 10$ g, teste a hipótese do peso médio das embalagens ser 700 g, com um nível de significância de 5%.

Resposta:

1. Definição das hipóteses

$$H_0 : \mu = 700 \quad vs \quad H_1 : \mu \neq 700.$$

2. Definição do nível de significância:

$$\alpha = 0.05$$

Exemplo: máquina de empacotar


3. Definir o tipo de teste: **teste bilateral**.

4. Determinação da região crítica:

$$RC = \{z < -1.96 \text{ ou } z > 1.96\}.$$

5. Cálculo da estatística de teste:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{698 - 700}{10/\sqrt{40}} = -1.265.$$



6. Conclusão: $z \notin RC$, portanto não rejeita-se H_0 .

Exemplo: resistência de lajotas

- Um fabricante introduziu um material na fabricação de lajotas, e acredita que aumentará a resistência média, que é de 206 kg. A resistência tem distribuição normal com desvio-padrão de 12 kg.



- Em uma amostra de 30 lajotas obteve-se $\bar{x} = 210$ kg. Pode-se afirmar que a resistência média aumentou, ao nível de 10%?

Resposta:

1. Definição das hipóteses

$$H_0 : \mu = 206 \quad vs \quad H_1 : \mu > 206.$$

2. Definição do nível de significância:

$$\alpha = 0.10$$

Exemplo: resistência de lajotas


3. Definir o tipo de teste: **unilateral à direita**.

4. Determinação da região crítica:

$$RC = \{z > 1.282\}.$$

5. Cálculo da estatística de teste:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{210 - 206}{12/\sqrt{30}} = 1.826.$$



6. Conclusão: $z \in RC$, portanto rejeita-se H_0 .

Exemplo: uso do cartão de crédito

- Deseja-se estimar a média anual de débitos no cartão de crédito nas famílias brasileiras. Uma amostra de 15 famílias forneceu média de saldos de R\$ 5200,00 e o desvio padrão de R\$ 3058,00.



- Teste a hipótese de que a média anual de débitos é de R\$ 6000,00, com nível com significância de 5%.

Resposta:

1. Definição das hipóteses

$$H_0 : \mu = 6000 \quad vs \quad H_1 : \mu \neq 6000.$$

2. Definição do nível de significância:

$$\alpha = 0.05$$

Exemplo: uso do cartão de crédito


3. Definir o tipo de teste: **teste bilateral**.

4. Determinação da região crítica:

$$RC = \{t < -2.145 \text{ ou } t > 2.145\}.$$

5. Cálculo da estatística de teste:

$$t_{obs.} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{5200 - 6000}{3058/\sqrt{15}} = 1.013.$$



6. Conclusão: $t \notin RC$, portanto não rejeita-se H_0 .

Exemplo: proporção de imunizados

- Uma empresa desenvolveu uma vacina e afirma que a proporção de imunizados é maior do que 50%. Sabe-se que em uma amostra de 726 pessoas vacinadas, 668 estavam imunizadas.



- Use este resultado para testar se a proporção de imunizados é maior do que 50%, com um nível de significância de 5%

Resposta:

1. Definição das hipóteses

$$H_0 : p = 0.5 \quad vs \quad H_1 : p > 0.5.$$

2. Definição do nível de significância:

$$\alpha = 0.05$$

Exemplo: proporção de imunizados


3. Definir o tipo de teste: **unilateral à direita**.

4. Determinação da região crítica:

$$RC = \{z > 1.645\}.$$

5. Cálculo da estatística de teste:


$$z_{obs.} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}} = \frac{0.92 - 0.5}{\sqrt{0.25/726}} = 22.633.$$




6. Conclusão: $z \in RC$, rejeita-se H_0 .

Estatística de teste e região crítica

Teste de hipótese para μ



Teste de hipótese para σ^2




- $$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

- $$\frac{(n - 1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$$

Exemplo: concentração de princípio ativo

- ▶ Na indústria farmacêutica, baixa variabilidade é sinônimo de qualidade. Por isso, monitora-se a produção a fim de que $\sigma^2 \leq 0.0009$, caso contrário o lote é rejeitado.



- ▶ Uma amostra de tamanho 16 foi inspecionada resultando em $s^2 = 0.0013$. Verifique se o lote será descartado, com $\alpha = 5\%$.

- ▶ **Resposta:**

1. Definição das hipóteses

$$H_0 : \sigma^2 = 0.0009 \quad vs \quad H_1 : \sigma^2 > 0.0009.$$

2. Definição do nível de significância:

$$\alpha = 0.05$$

Exemplo: concentração de princípio ativo


3. Definir o tipo de teste: **unilateral à direita**.

4. Determinação da região crítica:

$$RC = \{ q > 24.996 \}.$$

5. Cálculo da estatística de teste:

$$q_{obs} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(16-1)0.0013}{0.0009} = 21.66.$$



6. Conclusão: $q_{obs} \notin RC$. Não rejeita-se H_0 .

Referências

- Bussab, WO; Morettin, PA. Estatística Básica. São Paulo: Editora Saraiva, 2006 (5^a Edição).
- Magalhães, MN; Lima, ACP. Noções de Probabilidade e Estatística. São Paulo: EDUSP, 2008.

