

Testes de hipótese


Parte 8

Prof.: Eduardo Vargas Ferreira




Introdução

$$H_0 : \mu = 3 \quad vs \quad H_1 : \mu \neq 3$$



$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad vs \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$



Distribuição amostral da diferença

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad vs \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

→

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad vs \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

- Precisamos encontrar a **distribuição amostral da diferença das médias** $(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$, da mesma forma que fizemos nas aulas passadas:

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad vs \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$H_0 : p = p_0 \quad vs \quad H_1 : p \neq p_0$$


$$\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0, 1)$$

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad vs \quad H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

$$(n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Teste de hipótese

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$



1. Definir as hipóteses nula e alternativa:

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad vs \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

2. Com base em H_1 , definir o tipo de teste.

3. Definir um nível de significância α .

4. Determinar a região crítica baseado na distribuição amostral, sob H_0 .

5. Calcular a **estatística de teste**, sob H_0 .

$$z_{obs} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$


Testes de hipótese para a média de duas populações com σ^2 desconhecido

Suposições sobre as variâncias

- ▶ Quando não conhecemos σ^2 , utilizamos a estimativa amostral s^2 . No caso de teste de hipótese para a média, a distribuição deixar de ser **Normal** e se distribui segundo uma **t-student**.

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad \rightarrow \quad \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

- ▶ No entanto, quando temos duas amostras, devem ser considerados dois casos:




- Variâncias populacionais iguais ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$).
- Variâncias populacionais diferentes ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$).

Exemplo: rendimento das turmas

- ▶ Deseja-se testar uma metodologia de ensino. Para tanto, aplicou-se tal abordagem na turma A, permanecendo com o método tradicional na turma B. O rendimento médio dos alunos melhorou?



$$H_0 : \mu_A = \mu_B \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_A > \mu_B$$




Suposições sobre as variâncias

- ▶ Quando não conhecemos σ^2 , utilizamos a estimativa amostral s^2 . No caso de teste de hipótese para a média, a distribuição deixar de ser **Normal** e se distribui segundo uma **t-student**.

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad \rightarrow \quad \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

- ▶ No entanto, quando temos duas amostras, devem ser considerados dois casos:



- Variâncias populacionais iguais ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$).
- Variâncias populacionais diferentes ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$).

Estatística do teste quando as variâncias são iguais $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

- ▶ Neste caso, calculamos a **média ponderada das variâncias amostrais** s_1^2 e s_2^2 para obter uma estimativa da variância populacional comum

$$\hat{s}^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

- ▶ A estatística de teste fica

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\hat{s}^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_\nu, \quad \text{em que } \nu = n_1 + n_2 - 2$$

Exemplo: rendimento das turmas

- ▶ Deseja-se testar uma metodologia de ensino. Para tanto, aplicou-se tal abordagem na turma A, permanecendo com o método tradicional na turma B.



- T_A . Seleccionada uma amostra de 12 alunos da turma A, resultou em uma média de 7.9 com desvio-padrão 0.6;
- T_B . Seleccionada uma amostra de 15 alunos da turma B, resultou em uma média de 6.7 com desvio-padrão 0.8;

Verifique se turma A tem média maior do que a turma B, com um nível de significância de 1%, assumindo que $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Exemplo: rendimento das turmas

1. Definição das hipóteses


$$H_0 : \mu_A = \mu_B \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_A > \mu_B.$$

$$H_0 : \mu_A - \mu_B = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_A - \mu_B > 0.$$

5. Cálculo da estatística de teste:

$$\begin{aligned}\hat{s}^2 &= \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \\ &= \frac{(12 - 1) \cdot 0.6^2 + (15 - 1) \cdot 0.8^2}{12 + 15 - 2} \\ &= 0.517.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}t &= \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - 0}{\sqrt{\hat{s}^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{(7.9 - 6.7) - 0}{\sqrt{0.517 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{15} \right)}} \\ &= 4.309.\end{aligned}$$




Suposições sobre as variâncias

- ▶ Quando não conhecemos σ^2 , utilizamos a estimativa amostral s^2 . No caso de teste de hipótese para a média, a distribuição deixar de ser **Normal** e se distribui segundo uma **t-student**.

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad \rightarrow \quad \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

- ▶ No entanto, quando temos duas amostras, devem ser considerados dois casos:



- Variâncias populacionais iguais ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$).
- Variâncias populacionais diferentes ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$).

Estatística do teste para o caso de variâncias diferentes $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

- ▶ Neste caso, ainda usamos as variâncias amostrais s_1^2 e s_2^2 para determinar o **desvio-padrão da diferença entre as duas médias**. A estatística de teste fica

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_\nu.$$

- ▶ Porém, como as variâncias são diferentes, os **graus de liberdade** devem ser ajustados

$$\nu = \frac{(w_1 + w_2)^2}{\frac{w_1^2}{n_1 - 1} + \frac{w_2^2}{n_2 - 1}},$$

em que

$$w_1 = \frac{s_1^2}{n_1} \quad \text{e} \quad w_2 = \frac{s_2^2}{n_2}.$$

Exemplo: tempo de uma tarefa doméstica

- ▶ Uma pesquisa avaliou a eficácia de dois tipos de treinamento, com a finalidade de reduzir o tempo médio em determinada tarefa doméstica.



- ▶ Foram selecionadas duas a.a. de populações Normais, em que assume-se $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, obtendo os resultados abaixo:

Treinamento 1	$n_1 = 15$	$\bar{y}_1 = 24.2$ min	$s_1 = 3.16$ min
Treinamento 2	$n_2 = 10$	$\bar{y}_2 = 23.9$ min	$s_2 = 4.47$ min

Verifique se o tempo médio para a realização da tarefa é igual para os dois treinamentos, ao nível de 5% de significância.

Exemplo: tempo de uma tarefa doméstica

1. Definição das hipóteses


$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2.$$

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0.$$

4. Determinação da região crítica:

$$\begin{aligned} w_1 &= \frac{s_1^2}{n_1} = \frac{3.16^2}{15} & w_2 &= \frac{s_2^2}{n_2} = \frac{4.47^2}{10} \\ &= 0.66 & &= 1.99 \end{aligned}$$

$$\nu = \frac{(w_1 + w_2)^2}{\frac{w_1^2}{n_1 - 1} + \frac{w_2^2}{n_2 - 1}} = \frac{(0.66 + 1.99)^2}{\frac{0.66^2}{15 - 1} + \frac{1.99^2}{10 - 1}} = 14.93$$



5. Cálculo da estatística de teste:

$$\begin{aligned} t &= \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \\ &= \frac{24.2 - 23.9}{\sqrt{\frac{3.16^2}{15} + \frac{4.47^2}{10}}} = 0.184. \end{aligned}$$

Referências

- ▶ Bussab, WO; Morettin, PA. Estatística Básica. São Paulo: Editora Saraiva, 2006 (5ª Edição).
- ▶ Magalhães, MN; Lima, ACP. Noções de Probabilidade e Estatística. São Paulo: EDUSP, 2008.

